

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱- کدام یک از خطاهای منطقی زیر به نتیجه گیریهای منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد گفته می شود؟

- ۱. استنباط دلخواه
- ۲. شخصی سازی
- ۳. تعیین مفرط
- ۴. انتزاع گزینشی

۲- اختلال ادواری خوبی حالت خفیفتر کدام اختلال می باشد؟

- ۱. اختلال افسردگی اساسی
- ۲. اختلال دو قطبی
- ۳. اختلال یک قطبی
- SAD

۳- طبق نظریه روان تحلیلی فروید، افراد مستعد افسردگی در گذر از چه مرحله رشدی، با شکست مواجه شده اند؟

- ۱. مرحله جنسی
- ۲. مرحله ادبی
- ۳. مرحله معقدی
- ۴. مرحله دهانی

۴- در درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) با نور درخشان، نور چه تأثیری بر میزان ترشح ملاتونین دارد؟

- ۱. باعث کاهش مدت ترشح ملاتونین می شود.
- ۲. باعث افزایش مدت ترشح ملاتونین می شود.
- ۳. باعث اثرات متفاوتی در افراد متفاوت می شود.
- ۴. مدت اثر ملاتونین را در بدن بیشتر می کند.

۵- مشکلات نعوظی در مردان و فقدان انگیختگی جزء کدام دسته از نشانه های افسردگی است؟

- ۱. شناختی
- ۲. فیزیولوژیکی
- ۳. انگیزشی
- ۴. شناختی-رفتاری

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع استناد است؟

- ۱. استناد درونی
- ۲. استناد کلی
- ۳. استناد پایدار
- ۴. استناد کلی و پایدار

۷- کدام یک از گزینه های زیر جزء نشانه اصلی بلول برای اسکیزوفرنی نمی باشد؟

- ۱. دوسوگرایی
- ۲. ترجیح خیالپردازی به واقعیت
- ۳. آشفتگی خلق
- ۴. شکلی از التهاب مغزی بیحال کننده

۸- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

- ۱. آشفتگی روانی- حرکتی بارز
- ۲. هذیانهای پارانوئیدی
- ۳. آشفتگی های گفتاری
- ۴. آشفتگی های خلقی

۹- شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می گیرد؟

- ۱. ۲۰-۲۸
- ۲. ۳۹-۴۰
- ۳. ۲۰-۳۶
- ۴. ۱۸-۳۹

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

-۱۰- ضایعه در لوب تمپورال نیمکره چپ در بیشتر موارد چه اختلالی را ایجاد می کند؟

۲. اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک با آشفتگی گفتاری

۱. اسکیزوفرنی نوع آشفته با خلق بیحال

۴. اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهمند شناوی

۳. اسکیزوفرنی نوع باقی مانده با فقدان هذیانها

-۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گیروس استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۴. رفتار آشفته

۳. توهمند شناوی

۲. ناسازگاری اجتماعی

۱. اختلال در تفکر

-۱۲- کدام یک از جملات زیر در مورد نظریه فروم- ریچمن در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟

۱. پایگاه اجتماعی- اقتصادی به عنوان یک عامل خطر ابتلا به اسکیزوفرنی عمل می کند.

۲. اسکیزوفرنیا یک عامل سقوط به پایگاه اجتماعی پایین تر است.

۳. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش مادری که به نظر فداکار و صمیمی است اما در واقع خودمحور و سرد است.

۴. والدین غالباً با کودکان خود به شیوه های متضاد و سردرگم برخورد می کنند.

-۱۳- اختلالات شخصیت در کدام محور DSM-IV-TR مورد تشخیص واقع می شوند؟

۴. محور دوم

۳. محور چهارم

۲. محور سوم

۱. محور اول

-۱۴- براساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟

۴. علاقه به تنها

۳. کمال گرایی

۲. برون گرایی پایین

۱. روان رنجورخوبی بالا

-۱۵- همه گیرشناسی میزان شیوع اختلالات شخصیت پارانویایی چند درصد است؟

۴. ۲ تا ۳ درصد

۳. ۰/۵ تا ۰/۲ درصد

۲. ۱ تا ۴ درصد

۱. ۱ تا ۴ درصد

-۱۶- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیتهای نمایشی چیست؟

۲. تجزیه

۱. واپس زدن

۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۳. فرافکنی

-۱۷- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۴. رشد نمی کند.

۳. تغییری نمی کند.

۲. افزایش می یابد.

۱. کاهش می یابد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

-۱۸ از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلا به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله احتمال چه حرکتی است؟

- ۱. افسردگی
- ۲. خودکشی
- ۳. خود آسیب زنی
- ۴. روانپریشی

-۱۹ افکار خرافی، تفکر سحرآمیز، عقاید انتساب، اشتباہ حسی و مسخ واقعیت قسمتی از دنیای روزمره افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت زیر است؟

- ۱. اختلال شخصیت نمایشی
- ۲. اختلال شخصیت اسکیزوتاپیال
- ۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید
- ۴. اختلال شخصیت پارانوئید

-۲۰ اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

- ۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.
- ۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.
- ۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.
- ۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

-۲۱ ۸۰ تا ۹۰ درصد مبتلایان به بی اشتهایی روانی را افراد کدام گزینه زیر تشکیل می دهند؟

- ۱. زنان
- ۲. جوانان
- ۳. مردان
- ۴. افراد سالخورده

-۲۲ مهمترین پیامد سوءصرف ملینها و استفراغهای مکرر در پراشتهایی روانی چیست؟

- ۱. عدم تعادل الکتروولیت ها
- ۲. از دست دادن آب بدن
- ۳. آسیب شکمی
- ۴. مشکلات گوارشی

-۲۳ براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

- ۱. براساس صلاحیت فردی
- ۲. براساس چاقی یا لاغریشان
- ۳. با افکار و احساساتشان
- ۴. براساس تجارت

-۲۴ پراستفاده ترین رویکرد شناختی- رفتاری در درمان بی اشتهایی روانی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- ۱. گال
- ۲. بنت
- ۳. گارنو بیز
- ۴. راسل و همکاران

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله چهارم non-REM

۱. non-REM

۲. REM

۳. مرحله دوم خواب non-REM

- ۲۶- کدام یک از روش‌های زیر، شیوه مؤثری در درمان بیخوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی شرطی شدن مجدد

۱. درمان آرمیدگی

۲. دارو درمانی

۳. درمان مجدد محدودسازی خواب

- ۲۷- اصلی ترین ملاک تشخیص نارکولوپسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز

۱. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز

۲. حملات قابل کنترل در طول روز

۳. تجربه کاتاپلکسی (خشکردگی)

- ۲۸- کدام گزینه در مورد تبیین روان تحلیلگری اختلالات تغذیه‌ای صحیح است؟

۱. از طریق اعمال خود انضباطی غیرعادی است که بیمار بی اشتها احساس خودمختاری می کند.

۲. مبتلایان به پراستهای روانی بر فراخود کنترل دارند.

۳. مبتلایان به بی اشتها روانی قدرت الگوی بیشتری دارند.

۴. ثابتیت در مرحله مقعدی صورت می گیرد.

- ۲۹- در اختلال خواب مرتبط با تنفس، در طول یک شب باید چند آپنه وجود داشته باشد تا قابل تشخیص شود؟

۱. ۱۰ آپنه

۲. ۲۰ آپنه

۳. ۳۰ آپنه

۴. ۵ آپنه

۱. ۱۰ آپنه

- ۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

۱. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی

۲. بررسی سوابق خوابگردی

۳. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلالها

۴. بررسی تاریخچه بیماری

- ۳۱- کدام یک از موارد زیر جزء طبقات کلی روانشناسان و روانپژوهان از اختلالهای جنسی نمی باشد؟

۱. بدکارکردی جنسی

۲. اختلال هویت جنسی

۳. اختلالات جنسی

۴. پارافیلیاها

۱. بدکارکردی جنسی

- ۳۲- زمانی که انقباض غیرارادی قسمت خارجی اندام تناسلی زن مانع از آمیزش جنسی میگردد، کدام اختلال مدنظر است؟

۱. اختلال اوج لذت جنسی

۲. واژینیسم

۳. اختلال میل جنسی کم کار

۴. مقاربت دردناک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، ۲ پیامد بیش نظاره گری واحد (توسط مسترز و جانسون) مطرح شده اند، کدام اند؟

- ۱. اضطراب و خشم
- ۲. استرس و ترس
- ۳. خشم و ترس
- ۴. ترس و اضطراب

- ۳۴- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیتاشان دارند؟

- ۱. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
- ۲. از اندامهای جنسی، جنس مقابله متنفرند.
- ۳. احساس جذابیت نمی کنند.
- ۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

- ۳۵- در کدام اختلال بیمار به وسیله استفاده از اشیای بیجان (مثل لباس زیر زنانه) به ارضای تمایلات جنسی خود می پردازد؟

- ۱. یادگارخواهی همراه مبدل پوشی
- ۲. یادگارخواهی جنسی
- ۳. اختلال جنسی مالش دوستی
- ۴. نمایشگری جنسی

- ۳۶- «عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء، علیرغم سالم بودن کارکردهای حسی» چه نامیده می شود؟

- ۱. آمنزی
- ۲. آپراکسی
- ۳. آگنوزیا
- ۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

- ۳۷- در کدام نوع دماغی، در وجود بیماری جای شکی نمی ماند اما بیماری میتواند استقلال خود را حفظ کند؟

- ۱. نوع خفیف
- ۲. نوع مبهم
- ۳. متوسط
- ۴. نوع شدید

- ۳۸- کاهش کدام انتقال دهنده های عصبی در بیماری آلزایمر می تواند سهم عمده ای در آشتفتگی حسی و رفتار پرخاشجویانه داشته باشد؟

- ۱. استیل کولین و دوبامین
- ۲. سروتونین و نورآدرنالین
- ۳. استیل کولین و سروتونین
- ۴. سروتونین و دوبامین

- ۳۹- همراهی علائم روانی با بیماری پارکینسون چند درصد برآورد شده است؟

- ۱. ۱۵ الی ۲۵ درصد
- ۲. ۱۵ الی ۲۰ درصد
- ۳. ۳۰ الی ۵۰ درصد
- ۴. بیش از ۵۰ درصد

- ۴۰- علامت A در مدل IDEAL مربوط به کدام گزینه می باشد؟

- ۱. عمل براساس طرح قبلی
- ۲. تشخیص مسئله
- ۳. تعریف مسئله
- ۴. وارسی اثمندی طرح