

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: اقتصادسنجی

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱۰۹۷

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

-۱ متغیر بروز زا در مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ کدام است؟

۱. پارامترهای α و β

U_t ۲ Y_t ۳

-۲ با توجه به مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ کدام گزینه در خصوص روابط تخمین پارامترهای α و β صحیح نیست؟

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{X}$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum X_t Y_t}{\sum X_t^2}$$

$$\hat{\alpha} = \frac{\sum X_t^2 \sum Y_t - \sum X_t \sum X_t Y_t}{n \sum X_t^2 - (\sum X_t)^2}$$

$$\hat{\beta} = \frac{n \sum X_t Y_t - \sum X_t \sum Y_t}{n \sum X_t^2 - (\sum X_t)^2}$$

-۳ کدام گزینه در مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ صحیح است؟

۱. تخمین واریانس جمله اختلال به صورت $\sigma_u^2 = \frac{\sum e_t^2}{n-1}$ ناریب است.

$$E(\bar{U})^2 = \sigma_u^2$$

$$E(\sum U_t^2) = n \sigma_u^2$$

$$E(\hat{\beta} - \beta) \bar{U} = \sigma^2$$

-۴ در یک مدل رگرسیون خطی ساده اگر چنانچه مجموع جملات پسماندها برابر ۱۰۰ و مجموع کل تغییرات متغیر درون زا برابر ۵۰۰ بوده و تعداد مشاهدات نیز برابر ۲۵ باشد خطای معیار تخمین چقدر است؟

۴.۰۸ .۴

۴.۱۷ .۳

۴.۶۶ .۲

۴.۱

-۵ عبارت $E(U_i U_j) = ۰$ بیانگر کدام یک از فروض کلاسیک در خصوص جمله اختلال مدل رگرسیون خطی ساده می باشد؟

۱. واریانس همسانی جملات اختلال

۱. میانگین صفر جملات اختلال

۴. کروی بودن جملات اختلال

۳. عدم خودهمبستگی جملات اختلال

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: اقتصادسنگی

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۹۷-۱۲۱۰۹۷

-۶ در تخمین یک مدل رگرسیون خطی ساده بر اساس تعداد ده مشاهده، اگر $\hat{\beta} = 1/75$ و $\sigma^2 = ۲/۴۳$ باشد، حد بالای فاصله اطمینان ۹۵ درصد یک طرفه کدام است؟

$$\text{باشد} \rightarrow t_{0.025,8} = \pm ۲/۳۰۶$$

$$(t_{0.05,8} = \pm ۱/۸۹)$$

-۲،۷۷ . ۴

۳،۸۵ . ۳

۶،۲۷ . ۲

۷،۳۵ . ۱

-۷ دقت تخمین در مدل رگرسیون خطی ساده زمانی افزایش می یابد که:

۱. تعداد مشاهدات بیشتر و دامنه اختلاف مشاهدات از میانگین آنها کمتر باشد
۲. تعداد مشاهدات بیشتر و دامنه اختلاف مشاهدات از میانگین آنها بیشتر باشد
۳. تعداد مشاهدات کمتر و دامنه اختلاف مشاهدات از میانگین آنها کمتر باشد
۴. تعداد مشاهدات کمتر و دامنه اختلاف مشاهدات از میانگین آنها بیشتر باشد

-۸ در تخمین مدلی اگر $\hat{\sigma}^2 = ۱.۸$ بوده و تعداد مشاهدات ده باشد، فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای $\hat{\sigma}$ کدام است؟

$$(\chi^2_{0.975,8} = ۱۷.۵ \text{ و } \chi^2_{0.025,8} = ۲.۱۸)$$

۱.۵ < σ^2 < ۹.۲۷ . ۲

۰.۸ ۳ < σ^2 < ۶. ۷۱ . ۱

۰.۱۱ < σ^2 < ۸. ۳۹ . ۴

۱.۱ < σ^2 < ۱۲. ۶۵ . ۳

-۹ در آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ اگر داشته باشیم؛
 $n=10$ و $\sum xy = ۹۵۶$ ، $\sum x^2 = ۵۷۶$ ، $\sum y^2 = ۱۶۳۴$ ، $\hat{\beta} = ۱.۶۶$ مقدار آماره F حدوداً چه میزان است؟

$$C_t = \alpha + \beta Y_t + \gamma D_t + U_t$$

۱۶۱.۴ . ۴

۳۴۴.۸ . ۳

۲۶۹.۸ . ۲

۲۷۵.۸ . ۱

-۱۰ تخمین یک مدل رگرسیونی به صورت $\hat{Y}_t = ۱۰ + ۲X_t$ به دست آمده است. همچنین $۵/۰ = \hat{\beta}$ است. برای آزمون فرضیه $H_0: \beta = ۰$ در مقابل فرضیه $H_1: \beta \neq ۰$ کدام گزینه آماره Z و نتیجه آزمون را در سطح معنی داری ۵ درصد نشان میدهد.

$$(Z_{\frac{\alpha}{2}} = \pm ۱/۹۶)$$

۰.۰/۲۵ و H_0 نمیتواند رد شود . ۲

۰.۴ و H_0 نمیتواند رد شود . ۱

۰.۴ و H_0 رد می شود . ۴

۰.۳ و H_0 رد می شود . ۳

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: اقتصادسنگی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱۰۹۷

۱۱- در آزمون همزمان چند فرضیه در مورد پارامترها، بیشتر از کدام توزیع استفاده می شود؟

F . ۴

χ^2 . ۳

t . ۲

Z . ۱

۱۲- کدام یک از تخمین زننده های زیر برای تخمین میانگین جامعه (μ) نا اریب است؟

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

۴. هر سه نا اریب هستند

$$\tilde{\mu} = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i$$

۱۳- در مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ کدام رابطه نشاندهنده واریانس جمله اختلال است؟

$$\frac{\sum e_t^2}{n-2}$$

$$\frac{\sum e_t}{n-2}$$

$$\frac{\sum e_t^2}{\sum x_t^2}$$

$$\frac{\sum e_t^2}{\sum y_t^2}$$

۱۴- با توجه به تخمین یک مدل رگرسیون به صورت $\hat{Y}_t = -5 + 1.75 X_t$ که واریانس خطای پیش بینی در آن X_f برابر ۸۶،۰ و تعداد مشاهدات ۵ می باشد یک فاصله اطمینان ۹۰ درصد برای پیش بینی متغیر Y_t به ازای

به دست آورید. ($t_{0.025,3} = 3.182$ و $t_{0.05,3} = 2.353$)

$$13.81 < Y_f < 18.18$$

$$13.98 < Y_f < 18.02$$

$$13.04 < Y_f < 18.96$$

$$13.26 < Y_f < 18.74$$

۱۵- با توجه به مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ ، اگر همزمان متغیرهای X و Y دو برابر شوند کدام گزینه تغییر نتایج حاصل را به درستی نشان می دهد؟

۱. هم $\hat{\alpha}$ و هم $\hat{\beta}$ دو برابر می شوند

۲. هم $\hat{\alpha}$ و هم $\hat{\beta}$ دو برابر می شوند

۳. $\hat{\alpha}$ دو برابر شده ولی $\hat{\beta}$ بدون تغییر مانده ولی $\hat{\beta}$ دو برابر می شود

۴. $\hat{\alpha}$ دو برابر شده ولی $\hat{\beta}$ بدون تغییر باقی می ماند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: اقتصادسنگی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱۰۹۷

-۱۶- کدام یک از مدل های رگرسیون زیر را نمی توان به مدل رگرسیون خطی بر حسب پارامترها تبدیل کرد؟

$$Y_t = e^{(\alpha + \beta X_t + U_t)} \quad .\cdot ۲$$

$$Y_t = \alpha e^{\beta X_t} U_t \quad .\cdot ۱$$

$$Y_t = \alpha e^{(-\beta X_t)} + U_t \quad .\cdot ۴$$

$$Y_t = \frac{\alpha}{\beta - X_t} + U_t \quad .\cdot ۳$$

-۱۷- در مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ ، اگر $\hat{\alpha}'$ و $\hat{\beta}'$ تخمین پارامترهای عرض از مبدأ و شیب مربوط به رگرسیون معکوس مدل مورد نظر باشند کدام گزینه در خصوص روابط تخمین آنها صحیح است؟

$$\hat{\alpha}' = \bar{X} - \hat{\beta}' \bar{Y} \quad \text{و} \quad \hat{\beta}' = \frac{\sum xy}{\sum y^2} \quad .\cdot ۲$$

$$\hat{\alpha}' = \bar{Y} - \hat{\beta}' \bar{X} \quad \text{و} \quad \hat{\beta}' = \frac{\sum xy}{\sum y^2} \quad .\cdot ۱$$

$$\hat{\alpha}' = 0 \quad \text{و} \quad \hat{\beta}' = \frac{1}{\hat{\beta}} \quad .\cdot ۴$$

$$\hat{\alpha}' = \bar{Y} - \hat{\beta}' \bar{X} \quad \text{و} \quad \hat{\beta}' = \frac{\sum xy}{\sum y^2} \quad .\cdot ۳$$

-۱۸- در تخمین یک مدل رگرسیون خطی ساده، با فرض $\sum xy = ۲۱$ ، $r^2 = 0.9$ ، $\hat{\beta} = 0.75$ ، اگر β' پارامتر مربوط به ضریب زاویه رگرسیون معکوس مدل باشد، مقدار تخمین آن چقدر است؟

$$\hat{\beta}' = 1.2 \quad .\cdot ۴$$

$$\hat{\beta}' = 1.333 \quad .\cdot ۳$$

$$\hat{\beta}' = 0.25 \quad .\cdot ۲$$

$$\hat{\beta}' = 0.52 \quad .\cdot ۱$$

-۱۹- عبارت $\lim_{n \rightarrow \infty} MSE(\hat{\theta}) = ۰$ در بررسی خصوصیات تخمین زننده $\hat{\theta}$ به چه معناست؟

۴. کمترین واریانس

۳. کارایی حدی

۲. سازگاری

۱. نااربی

-۲۰- در مقایسه دو تخمین زننده، به طور قطع در کدام حالت یک تخمین زننده بر دیگری ترجیح داده می شود؟

۱. تخمین زننده ناارب و دارای واریانس کمتر مرجح تر است.

۲. تخمین زننده ناارب و دارای واریانس بیشتر مرجح تر است

۳. تخمین زننده ناارب ولی دارای واریانس بیشتر بر تخمین زننده اریب دار ولی دارای واریانس کمتر ترجیح داده می شود

۴. تخمین زننده اریب دار ولی دارای واریانس کمتر بر تخمین زننده ناارب ولی دارای واریانس بیشتر ترجیح داده می شود

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: اقتصادسنگی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۹۷-۱۳۲۱

-۱۱ در مدل رگرسیونی کدام گزینه معادل ضریب تعیین R^2 می باشد؟

$$\frac{(\sum x_{lt} \hat{x}_{pt})^2}{\sum x_{pt}^2 \sum \hat{y}_t^2}$$

$$\frac{(\sum x_{lt} \hat{y}_t)^2}{\sum x_{pt}^2 \sum \hat{y}_t^2}$$

$$\frac{(\sum y_{lt} x_{pt})^2}{\sum x_{lt}^2 \sum x_{pt}^2}$$

$$\frac{\hat{\beta}_1 \sum x_{lt} y_t + \hat{\beta}_p \sum x_{pt} y_t}{\sum y_t^2}$$

-۱۲ کدام گزینه پیش بینی فاصله ای برای میانگین Y_f را در سطح آزمون α در صد به درستی نشان می دهد؟

$$\hat{Y}_f - t_{\alpha} SE(e_f) < E(Y_f) < \hat{Y}_f + t_{\alpha} SE(e_f)$$

$$\hat{Y}_f - t_{\frac{\alpha}{2}} SE(e_f) < E(Y_f) < \hat{Y}_f + t_{\frac{\alpha}{2}} SE(e_f)$$

$$\hat{Y}_f - t_{\frac{\alpha}{2}} Var(e_f) < E(Y_f) < \hat{Y}_f + t_{\frac{\alpha}{2}} SE(e_f)$$

$$\hat{Y}_f - t_{\alpha} Var(e_f) < E(Y_f) < \hat{Y}_f + t_{\alpha} SE(e_f)$$

-۱۳ با توجه به مدل رگرسیون بیانگر کدام گزینه عبارت $Y_t = \alpha + \beta_1 X_{lt} + \beta_p X_{pt} + U_t$ است؟

$$Var(\hat{\beta}_p)$$

$$cov(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_p)$$

$$cov(\hat{\alpha}, \hat{\beta}_p)$$

$$Var(\hat{\beta}_1)$$

-۱۴ در مدل رگرسیون چند متغیره $Y = X\beta + U$ عبارت $\rho(X) = k$ که در آن K تعداد پارامترها و (X) رتبه ماتریس X می باشد بیانگر کدام یک از فرض های کلاسیک در خصوص جمله اختلال است؟

۱. واریانس همسانی

۱. واریانس همسانی

۲. واریانس ناهمسانی

۲. واریانس ناهمسانی

۳. عدم خودهمبستگی

۳. عدم خودهمبستگی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: اقتصادسنگی

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱۰۹۷

۲۵- با توجه به مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + U_t$ ضریب تعیین R^2 را محاسبه می نماید.

$$R^2 = \frac{yx'(x'x)^{-1}x'y}{x'x} \quad .\cdot^2$$

$$R^2 = \frac{\hat{\beta}'x'y}{y'y} \quad .\cdot^1$$

$$R^2 = \frac{y'y}{\hat{y}'\hat{y}} \quad .\cdot^4$$

$$R^2 = 1 - \frac{y'y}{x'x} \quad .\cdot^3$$

۲۶- در یک مدل رگرسیون با ۲۱ مشاهده و $K = 5$ ، اگر ضریب تعیین برابر 0.84 باشد، ضریب تعیین تعدیل شده چقدر خواهد بود؟

۰.۸۵ .۴

۰.۸۳ .۳

۰.۸۰ .۲

۰.۷۹ .۱

۲۷- کدام گزینه در خصوص آثار و نتایج ضریب تعیین صحیح است؟

۱. مدل دارای R^2 بسیار بالا ولی بدون مبنای نظری قوی نسبت به مدل دارای R^2 پایین تر ولی با مبنای نظری قوی تر، مرجح است.

۲. مدل دارای R^2 پایین ولی برخوردار از مبنای نظری قوی نسبت به مدل دارای R^2 بالا ولی با مبنای نظری ضعیف تر، مرجح است.

۳. R^2 بسیار بالا نشانگر یک رابطه علت و معلولی قوی بین X_t و Y_t است.

۴. معیار R^2 نقش بسیار بالایی در استنتاج نهایی درباره خوبی تخمین مدل رگرسیون دارد.

۲۸- وجود همبستگی کامل خطی بین متغیرهای توضیحی در مدل رگرسیون چند متغیره؟

۱. منجر به اریب دار شدن تخمین پارامترها می شود.

۲. باعث افزایش واریانس تخمین پارامترها می شود.

۳. منجر به اریب دار شدن تخمین پارامترها شده و واریانس آنها را افزایش می دهد

۴. تخمین مستقل هریک از پارامترها را عمل غیر ممکن می سازد.

۲۹- برای تخمین رابطه بین دو متغیر X_t و Y_t افزایش یابد، کدام مدل مناسب تر است؟

$$Y_t = \alpha + \beta \ln X_t + U_t \quad .\cdot^2$$

$$Y_t = \alpha X_t^\beta e U_t \quad .\cdot^1$$

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t \quad .\cdot^4$$

$$\ln Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t \quad .\cdot^3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: اقتصادسنگی

رشته تحصیلی/ کد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱۰۹۷

-۳۰ در مدل رگرسیون خطی ساده، با این فرض که $w = \frac{x}{\sum x}$ حاصل عبارت $\hat{\beta} - \beta$ کدام است؟

$$\sum w_t Y_t = w_1 Y_1 + w_p Y_p + \dots + w_n Y_n \quad .۲$$

$$\sum w_t U_t = w_1 U_1 + w_p U_p + \dots + w_n U_n \quad .۱$$

$$(\alpha - \hat{\alpha}) \bar{X} + \bar{U} \quad .۴$$

$$\sum \left[\frac{1}{n} - \bar{X}w \right] Y \quad .۳$$

-۳۱ در مدل رگرسیون چند متغیره، حذف تعدادی از متغیرها در صورتی باعث افزایش \bar{R}^2 می شود که:

۱. باشد $F > 1$

۲. باشد $F < 1$

۳. باشد $F = 1$

۴. حذف متغیرها هیچگاه باعث افزایش \bar{R}^2 نمی شود.

-۳۲ با توجه به اطلاعات زیر در تخمین مدل رگرسیون $Y_t = \beta_1 + \beta_p X_{pt} + \beta_m X_{mt} + U_t$ مقدار آماره t به منظور

$$H_0: [2 \quad -3] \begin{bmatrix} \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = 10 \quad \text{در سطح معناداری } 5 \text{ درصد چقدر است؟}$$

$$VAR(C' \hat{\beta}) = 81 \quad \begin{bmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

۱. ۰,۵۹ .۴

۲. ۰,۵۵ .۳

۳. ۰,۶۹ .۲

۴. ۰,۶۸ .۱

-۳۳ تحت چه شرایطی ماتریس واریانس-کوواریانس را می توان به صورت $I \sigma^2$ نوشت؟

۱. عدم وجود واریانس همسانی و عدم وجود خودهمبستگی

۱. وجود خود همبستگی و واریانس همسانی

۲. صفر بودن میانگین جز اخلاق و وجود خود همبستگی

۳. وجود واریانس همسانی و عدم وجود خود همبستگی

-۳۴ کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

$$E(Y_f) = 0 \quad .۴$$

$$\hat{E}(Y_f) = \hat{Y}_f \quad .۳$$

$$E(Y_f) > Y_f \quad .۲$$

$$E(Y_f) < Y_f \quad .۱$$

-۳۵ در تخمین مدل رگرسیون $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ به روش حداقل درستنمایی، تخمین کدام مورد دارای اریب

است؟

$$\hat{\sigma}_u^2 \quad .۴$$

$$\hat{\beta}, \hat{\alpha} \quad .۳$$

$$\hat{\beta} \quad .۲$$

$$\hat{\alpha} \quad .۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: اقتصادسنگی

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱-۹۷

- ۳۶ با توجه به مدل $C_t = \beta_1 + \beta_2 Y_t + \beta_3 C_{t-1} + \beta_4 L_{t-1} + U_t$ در صدد انجام آزمون فرضیه $H_0: \beta_3 = \beta_4 = 0$ می باشیم. با توجه به اطلاعات زیر مقدار F مربوط به آزمون والد چقدر می باشد؟

$$n = 31 \quad RSS_r = ۱۳۳.۸۴۴ \quad RSS = ۳۰.۵۸۴$$

۱۲،۴۸ . ۴

۱۴،۵ . ۳

۳۸،۵۷ . ۲

۳۵،۷۵ . ۱

- ۳۷ کاربری آزمون های چاو در تخمین مدل رگرسیون چند متغیره کدام است؟

۱. آزمون فرضیه و پیش بینی

۴. آزمون واریانس ناهمسانی

۱. آزمون فرضیه و پیش بینی

۳. آنالیز واریانس

- ۳۸ مدل سرمایه گذاری $I = \gamma_0 + \gamma_1 r + u$ را به ترتیبی بنویسید که بیانگر تفاوت شیب در دو منطقه باشد؟

$$I = \gamma_0 + \gamma_1 Dr + u \quad \cdot ۲$$

$$I = \gamma_0 + \gamma_1 r + \gamma_2 D + U \quad \cdot ۱$$

$$I = \gamma_0 + \gamma_1 r + \gamma_2 D + \gamma_3 rD + u \quad \cdot ۴$$

$$I = \gamma_0 + \gamma_1 r + \gamma_2 rD + U \quad \cdot ۳$$

- ۳۹ متغیر مجازی در $C_t = \alpha + \beta Y_t + \gamma D_t + U_t$ بر کدامیک از موارد زیر تأثیر گذاشته است؟

۲. شیب مدل است

۱. جمله ثابت مدل است

۴. جمله اختلال مدل است

۳. جمله ثابت و شیب مدل است

- ۴۰ مدلی به صورت $\hat{Y}_t = ۲۰ + ۰/۵ X_t$ برآورد شده است. اگر Y_t دو برابر شود، ضریب تعیین R^2 چقدر تغییر می کند؟

۴. چهار برابر

۳. تغییر نمی کند

۲. نصف

۱. دو برابر

- ۴۱ مدل رگرسیون $Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + U_t$ را در نظر گرفته و با توجه به اطلاعات به دست آمده به شرح زیر، فرضیه $H_0: \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ را در سطح معناداری ۵ درصد آزمون کنید.

$$F_{3,20} = ۳.۱۰ \quad F_{2,20} = ۳.۴۹ \quad n = ۲۵ \quad RSS = ۱.۵ \quad RSS_r = ۲$$

۱. فرضیه H_0 رد می شود

۲. فرضیه H_0 رد نمی شود

۳. با فرض $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ امکان تخمین مدل وجود ندارد

۴. اطلاعات برای آزمون مورد نظر ناکافی است

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۵ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.net

عنوان درس: اقتصادسنگی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اقتصادی (اقتصادنظری)، علوم اقتصادی (نظری) چندبخشی ۱۲۲۱۰۹۷

۴۲- اگر $\hat{\theta}$ هر تخمین زننده دلخواه باشد، عبارت $\hat{\theta} - \theta$ معادل کدام گزینه است؟

$$Var(\hat{\theta})$$

$$MSE(\hat{\theta})$$

۲. مقدار اریب

۱. خطای نمونه گیری

۴۳- کدام گزینه صحیح است؟

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \hat{\sigma}^2 - \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \sigma^2$$

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = E(\hat{\sigma}_{OLS}^2) = 0$$

$$E(\hat{\sigma}_{ML}^2) = \hat{\sigma}_{OLS}^2 + \hat{\sigma}_{ML}^2$$

۴۴- از جمله فروض کلاسیک در مورد جزء اختلال کدام است؟

۴. واریانس همسانی

۳. وجود خود همبستگی

۲. غیر تصادفی است

۱. امید ریاضی غیر صفر

۴۵- با توجه به مدل رگرسیون $Y_t - E(Y_t)$ ، حاصل $Y_t = \alpha + \beta X_t + U_t$ برابر کدام گزینه خواهد بود؟

$$\sigma_u^2$$

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} \hat{X}_t$$

$$U_t$$

$$e_t$$