

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی www.PnuNews.com www.PnuNews.net

۱۲۱۷۰۶۱

عمومی

- افسردگی بهنجارچه تفاوتی با افسردگی یک قطبی دارد؟

۱. نشانه های بهنجار کمتر ولی طولانی تر است.
۲. نشانه های بهنجار شدیدترند.
۳. نشانه های یک قطبی شدیدتر و فراوان ترند.
۴. نشانه های یک قطبی خفیف تر ولی طولانی ترند.

- نشانه های شناختی افسردگی از دیدگاه بک (Beck) چه موردی را شامل نمی شود؟

۱. نظر منفی نسبت به خود
۲. نظر منفی نسبت به دیگران
۳. نظر منفی نسبت به آینده
۴. نظر منفی نسبت به گذشته

- افراد مبتلا به اختلال افسردگی خوبی دست کم به چه مدتی به برخی از نشانه های افسردگی اساسی مبتلا می شوند؟

- |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|-----------|
| ۱. ۲ سال | ۲. ۲ ماه | ۳. ۲ روز | ۴. ۲ هفته |
|----------|----------|----------|-----------|

- چنانچه یک فرد مبتلا به افسردگی، در مرکز به یک امر جزیی بی اهمیت منفی در عین حال به نادیده گرفتن و بیزگی های مثبت مهم تر اقدام نماید، کدام یک از پنج خطای منطقی را انجام داده است؟

- |               |              |                  |                    |
|---------------|--------------|------------------|--------------------|
| ۱. تعمیم مفرط | ۲. شخصی سازی | ۳. انتزاع گزینشی | ۴. استنباط دلخواهی |
|---------------|--------------|------------------|--------------------|

- کدام دسته از روانشناسان اعتقاد دارند که مانیا یک مکانیسم دفاعی افراطی در مواجهه با حالات هیجانی ناخوشایند یا تکانه های نامقبول می باشد؟

- |                |                 |                    |                   |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| ۱. رفتارگرایان | ۲. شناخت گرایان | ۳. زیست شناخت گران | ۴. روان تحلیلگران |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|

- این اختلال حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد نشانه های افسردگی اساسی را به طور خفیف و هیپومانی را به صورت دوره ای تجربه می نماید؟

- |                 |                |                   |                 |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| ۱. دوقطبی نوع I | ۲. ادواری خوبی | ۳. دو قطبی نوع II | ۴. افسردگی فصلی |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|

- از دیدگاه این دانشمند چهار نشانه اصلی اسکیزوفرنی عبارتند از: دوسوگرائی، آشفتگی تداعی ها، آشفتگی خلق و خیال پردازی؟

- |          |            |          |       |
|----------|------------|----------|-------|
| ۱. بلولر | ۲. کراپلین | ۳. فروید | ۴. بک |
|----------|------------|----------|-------|

- نشانه های مثبت اسیکزوفرنی عبارتند از:

- |                   |                          |                            |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| ۱. هذیان - توهمند | ۲. فقدان تکلم - نقص توجه | ۳. خلق بی حالت - بی ارادگی |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی کارشناسی

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۹- در این نوع از اسکیزوفرنی تهییج افراطی، بهت و انعطاف مومی شکل دیده می شود؟

- ۱. هیفرنیا
- ۲. پارانویید
- ۳. کاتاتونیک
- ۴. باقی مانده

۱۰- شایعترین نشانه‌ی اسکیزوفرنی حاد که این بیماری را از بسیاری دیگر از اختلالات متمایز می کند چیست؟

- ۱. گفتار آشفته
- ۲. شروع ناگهانی و بهبودی زیاد
- ۳. تفکرات آشفته
- ۴. شروع آرام و پیش آگهی بد

۱۱- طبق نظر فارل و شاو افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در چه زمینه‌ای مشکل دارند؟

- ۱. در تفكیر
- ۲. در حافظه
- ۳. در مهارت‌های فرا شناختی
- ۴. ناتوانی در فهم و توصیف حالت‌های هیجانی

۱۲- مشخصه‌های بالینی خاصی که با پیش آگاهی ضعیف برای تشخیص اسکیزوفرنی به کار می رود عبارتند از؟

- ۱. طبقه اجتماعی بالا- جنسیت موئنث - وجود مولفه برجسته
- ۲. شروع دیررس- جنسیت موئنث - نشانه‌های مثبت
- ۳. طبقه اجتماعی متوسط - IQ بالا - جنسیت مذکور
- ۴. شروع زودرس- جنسیت مذکور- نشانه‌های منفی

۱۳- براساس این مدل روانشناختی مبتلایان به اسکیزوفرنیا در مواجهه با استرس‌های زندگی از راهبردهای مقابله‌ای ضعیف تری استفاده می کنند؟

- ۱. مدل ضربه‌ای روانی و توهمات
- ۲. مدل شناختی هذیان‌ها
- ۳. مدل مقابله‌ای
- ۴. مدل زیست روانشناختی

۱۴- براساس مهمترین یافته‌های عکس برداری از مغز کاهش حجم کرتکس در کدام نواحی با اسکیزوفرنی ارتباط بیشتری دارد؟

- ۱. لوب پیشانی - پس سری
- ۲. لوب گیجگاهی - پیشانی
- ۳. لوب گیجگاهی - آهیانه‌ای
- ۴. لوب گیجگاهی - آهیانه‌ای

۱۵- افراد مبتلا به اختلال شخصیت، حداقل در چند مورد از انتظارات فرهنگی دچار انحراف هستند؟

- ۱. یک مورد
- ۲. دو مورد
- ۳. سه مورد
- ۴. چهار مورد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی کارایی بیشتر هستم

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۶- اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرند؟

۲. دسته دوم - هیجانی

۱. دسته سوم - عجیب و غریب

۴. دسته دوم - ترسو

۳. دسته سوم - مضطرب

۱۷- براساس مدل شناختی بک این باور که من اساساً یک فرد تنها هستم و زمانیکه تنها هستم دارای کارایی بیشتر هستم، مربوط به کدام نوع از اختلالات شخصیت می باشد؟

۲. شخصیت نمایشی

۱. شخصیت ضد اجتماعی

۴. شخصیت وابسته

۳. شخصیت اسکیزوئید

۱۸- مکانیسم دفاعی اصلی در شخصیت های نمایشی چیست؟

۲. انکار

۱. واپس زدن و تجربه

۴. پالایش

۳. والایش

۱۹- از نظر سبب شناسی چه عاملی شخصیت سایکوپات را از شخصیت ضد اجتماعی تمایز می کند؟

۲. هیجانات ضعیف و مشکلات خستگی

۱. افکار دوگانه

۴. شکایتهای جسمانی و مکانیسم های دفاعی

۳. گسلش هیجانی - عمق محدود هیجانات

۲۰- در نظام طبقه بندی ICD-10، از کدام اختلال شخصیت به عنوان اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات نام برده می شود؟

۴. مرزی

۳. نمایشی

۲. ضد اجتماعی

۱. اسکیزووتایپال

۲۱- هدف اولیه درمان برای افراد دارای اختلال شخصیت زیر ۳۰ سال چیست؟

۴. ایجاد حمایت اجتماعی

۳. پیشگیری از خودکشی

۲. مدیریت رفتار

۱. کنترل هیجانات

۲۲- سطوح بالای تکانشی بودن، تحریک پذیری، پرخاشگری و درجستجوی هیجان بودن در اختلال شخصیت ضد اجتماعی با کدام انتقال دهنده عصبی رابطه دارد؟

۴. نورآدرنالین

۳. دوپامین

۲. آدرنالین

۱. سرونوئین

۲۳- در کدام نوع از اختلال بی اشتهاهی روانی، اختلال شخصیت و کنترل تکانه مشاهده می شود؟

۲. پرخوری - پاکسازی

۱. محدود کننده

۴. محدود کننده - پاکسازی

۳. پرخوری محدود کننده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی کارشناسی www.PnuNews.com www.PnuNews.net

عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۴۴- مهم ترین پیامد رفتارهای جبرانی در اختلال پراشتهاي روانی چيست؟

۱. عدم تعادل الکتروولیت

۱. مشکلات گوارashi

۲. آسیب دندان ها

۳. دردهای شکمی

۴۵- از نظر روان تحلیل گران علت بی اشتهاي روانی در نوجوانان در کدام گزینه ذکرنشده است؟

۱. افزایش عملکرد اجتماعی

۱. کسب استقلال بیشتر

۲. اختلال شناختی

۳. افزایش عملکرد جنسی

۴۶- براساس مطالعات ۲۱ درصد مرگ بیماران مبتلا به بی اشتهاي روانی براثر چیست؟

۱. غلظت پایین مواد معدنی

۱. فشارخون پایین- آمنوریا

۲. ترك برداشت پوست - آمنوریا

۳. گرسنگی - خودکشی

۴۷- توهه های هیپنagogیک و هیپنوبامییک در کدامیک از نوع اختلال خواب شایع است؟

۱. بی خوابی اولیه

۲. کابوس

۳. نارکولپسی

۱. پرخوابی اولیه

۴۸- به اختلالی که در آن فرد در ثلث اول شب در حالت خواب عمیق باشد و ناگهان از خواب بیدار شود و با تجربه ترس، داد و فریاد یا گریه همراه است، چه می گویند؟

۱. اختلال کابوس

۲. آپنه

۳. خواب گردی

۴. وحشت شبانه

۴۹- کمبود انتقال دهنده عصبی هیپوکرتین در ابتلا به کدام اختلال خواب موثر است؟

۱. خوابگردی

۲. نارکولپسی

۳. کابوس

۴. وحشت شبانه

۵۰- مدت زمان لازم برای تشخیص بی خوابی اولیه چقدر می باشد؟

۱. ۱ ماه

۲. ۱۰ روز

۳. ۱۰ ماه

۴. ۱ هفته

۵۱- اختلال نعوظی در کدام طبقه بندی سنی بیشتر شیوع دارد؟

۱. ۱۸-۲۹

۲. ۴۰-۴۹

۳. ۵۰-۵۹

۴. ۳۰-۳۹

۵۲- براساس پارادیم روان تحلیل گری، اگر مادر صمیمی و حمایت گر و پدر سرد و تهدیدکننده باشد، احتمالاً فرزند مذکور دچار چه اختلالی خواهد شد؟

۱. یادگارخواهی جنسی

۲. مبدل پوشی

۳. پارافیلی NOS

۴. اختلال ارگاسmi

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

روش تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی کارشناسی

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

۲. شناختی

۱. روان تحلیل گری

۴. شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی

۳. زیستی

۳۴- براساس DSM-IV اختلال در کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به آلزایمر شامل کدام مورد می شود؟

۲. مشکل در برنامه ریزی، انتزاع و سازماندهی

۱. فقدان حافظه و ناتوانی تشخیصی

۴. آسیب در انجام اعمال هدفمند

۳. آشفتگی زبانی

۳۵- کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیربا بیماری آلزایمر رابطه ندارد؟

۴. سروتونین

۳. نورادرنالین

۲. استیل کولین

۱. دوبامین

۳۶- تمایلات، رفتارها و تخیلات جنسی شدید و تکراری در واکنش به موقعیات ناپسند جامعه چه نامیده می شوند؟

۴. دمانس جنسی

۳. آگنوزیاها

۲. پارافیلیاها

۱. دیس سومنیاها

۳۷- وجود کدام اختلال در بیماران مبتلا به MS موجب پیشرفت سریع بیماری، ناتوانی شدید و مرگ می شود؟

۴. خودکشی

۳. افسردگی

۲. خستگی

۱. استرس

۳۸- فقدان سلول های رنگدانه ای در جسم سیاه و هسته های رنگی دیگر مغز منجر به شکل گیری چه اختلالی می شود؟

۴. آلزایمر

MS . ۳

۲. پارکینسون

۱. صرع

۳۹- در بیماری صرع، حالات روان شناختی خشم و پارانویا به کدام مورد زیر مربوط می شود؟

۴. لوب پس سری

۳. لوب گیجگاهی چپ

۲. لوب آهیانه ای

۱. لوب گیجگاهی راست

۴۰- مهارت IDEAL که توسط برانسفورد و استاین ارائه گردید، به چه موضوعی مربوط است؟

۴. درمان افسردگی

۳. تصمیم گیری

۲. مشکلات حافظه

۱. حل مساله