

س.م.س.۱۱.۰.نک.۱

زمان آزمون (دقیقه): تست، ۶۰ تا ۷۵

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی / گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۳۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی

روانشناسی ۱۲۱۷۷۲۴۰ - ۱۲۱۷۰۶۱

۱- رایج ترین اختلال روانی کدام است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. افسردگی ۳. اختلال شخصیت ۴. اختلال جسمانی شکل

۲- افسردگی مضاعف به چه معناست؟

۱. مجموع افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی
۲. مجموع افسردگی اساسی و افسرده خوبی
۳. مجموع افسردگی اساسی و اختلال ادواری خوبی
۴. مجموع افسردگی اساسی و اختلال عاطفی فصلی

۳- کدامیک از موارد زیر از باورهای مطرح شده در مثلث شناختی بک نیست؟

۱. باور مربوط به خودمان
ۡ. باور مربوط به گذشته
ۢ. باور مربوط به آینده
ۣ. باور مربوط به رخدادها یا افراد دیگر

۴- هورمون ملاتونین در ابتلا به کدام اختلال نقش بیشتری دارد؟

۱. افسردگی اساسی ۲. اختلال دو قطبی ۳. اختلال ادواری خوبی ۴. اختلال عاطفی فصلی

۵- گزینه صحیح کدام است؟

۱. در اختلال ادواری خوبی فرد نشانه های افسردگی اساسی و مانی را به طور شدید تجربه می کند.
۲. اختلال ادواری خوبی اختلال حاد و دوره ای است.
۳. افراد مبتلا به اختلال ادواری خوبی شدیداً در معرض خطر ابتلا به اختلال دو قطبی کامل قرار دارند.
۴. اختلال ادواری خوبی همان اختلال افسردگی اساسی است.

۶- طبق مدل شناختی، عامل ایجاد کننده افسردگی و مانی چیست؟

۱. اشتغال ذهنی با از دست دادن واقعی و خیالی
ۡ. تکانه های نامقبول
ۢ. عدم دریافت تقویت
ۣ. عزت نفس پایین و معیارهای غیر واقع گرایانه

۷- کدام دارو برای تعدیل نوسانات خلقی اختلال دو قطبی تجویز می شود؟

۱. دسی پرامین ۲. ایمی پرامین ۳. فلوکستین ۴. لیتیوم بی کربنات

۸- صحبت و رفتار آشفته و خلق نامتناسب از مشخصه های اصلی کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. پارانوئید ۳. باقیمانده ۴. هبفرنیا

۹- کدامیک از نشانه های زیر جزء نشانه های منفی اسکیزوفرنی محسوب نمی شود؟

۱. هذیان ۲. بی احساسی ۳. فقر گفتار ۴. انزواج اجتماعی

س.م.س.م.۱۰.۱۱.۱۲

زمان آزمون (دقیقه): تست، ۶۰: تشتیع، ۰:۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۲۱۷۷۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افرایش اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

- ۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اویل بهار
- ۲. متولدین آخر تابستان
- ۳. متولدین اویل تابستان
- ۴. متولدین اویل بهار

۱۱- کدام مشخصه بالینی با پیش آگهی بد اسکیزوفرنی ارتباط دارد؟

- ۱. شروع زودرس یا تدریجی
- ۲. جنسیت مونث
- ۳. نشانه های مثبت
- ۴. IQ بالا

۱۲- ضایعه در کدام نواحی مغزی با احتمال بیشتر ایجاد اسکیزوفرنی پارانوئید رابطه دارد؟

- ۱. لوپ تمپورال نیمکره چپ
- ۲. لوپ تمپورال نیمکره راست
- ۳. لوپ پریتال نیمکره چپ
- ۴. لوپ پریتال نیمکره راست

۱۳- کدام مدل معتقد است که مبتلایان به اسکیزوفرنی از راهبردهای مقابله ای ضعیفتری در مواجه با استرس های زندگی استفاده می کنند؟

- ۱. مدل ضربه روانی
- ۲. مدل مقابله ای
- ۳. مدل شناختی
- ۴. مدل روانکاوی

۱۴- ویژگی بارز دسته سوم اختلالات شخصیتی چیست؟

- ۱. افسردگی
- ۲. اضطراب
- ۳. هیجان
- ۴. عجیب و غریب بودن

۱۵- کدامیک از اختلالات شخصیت در زنان شایع تر است؟

- ۱. مرزی
- ۲. ضد اجتماعی
- ۳. خودشیفته
- ۴. دوری گزین

۱۶- علامت بارز اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

- ۱. سوء ظن
- ۲. تنهایی مفرط
- ۳. ناپهنجاری در تفکر
- ۴. نقض مقررات

۱۷- مکانیسم دفاعی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟

- ۱. واپس زدن
- ۲. فرافکنی
- ۳. جداسازی
- ۴. والايش

۱۸- سن لازم برای تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی چند سال است؟

- ۱. حداقل ۱۵
- ۲. حداقل ۱۸
- ۳. حداقل ۲۰
- ۴. حداقل ۱۳

۱۹- مکانیزم دفاعی جداسازی در کدامیک از اختلال زیر بیشتر استفاده می شود؟

- ۱. خودشیفته
- ۲. نمایشی
- ۳. دوری گزین
- ۴. مرزی

س.م.س.۱۰.۱۱.دک.

زمان آزمون (دقیقه): تست، ۶۰: تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۲۱۷۷۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

۲۰- در رابطه با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری کدام گزینه نادرست است؟

۱. کمال گرایی در این مبتلایان مشاهده می شود.
۲. ویژگی این بیماران به افراد تیپ A شبیه است.
۳. اشتغال ذهنی با نظم از نشانه های این اختلال است.
۴. این بیماران تمایل شدید به محول کردن کارهای خود به دیگران دارند.

۲۱- فردی بدون دلیل از افراد صاحب قدرت انتقاد کرده و آنها را تحقیر می کند ، عبوس و اهل مجادله است و بین مخالفت خصمانه و پشیمانی در نوسان است ، وی احتمالا به کدام نوع اختلال شخصیت مبتلا است؟

۱. افسرده
۲. منفعل پرخاشگر
۳. وابسته
۴. ضداجتماعی

۲۲- کدام گزینه نادرست است؟

۱. افراد مبتلا به بی اشتہایی روانی عزت نفس و جرات مندی پایینی دارند.
۲. اختلال بی اشتہایی روانی در زنان بی سواد و طبقات اجتماعی پایین تر شایع تر است.
۳. مشغله ذهنی مبتلایان به بی اشتہایی روانی کنترل وزن است.
۴. بی اشتہایی روانی در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی شایع تر است.

۲۳- کدامیک از موارد زیر در نوع محدود کننده بی اشتہایی روانی مشاهده می شود؟

۱. مصرف نایجای ملین ها
۲. مصرف مدرها
۳. تنقیه کردن
۴. مصرف مواد کم کالری

۲۴- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتہایی روانی چیست؟

۱. غلظت پایین مواد معدنی
۲. ترک برداشتن پوست
۳. آمنوریا
۴. فشار خون پایین

۲۵- طبق ملاک های تشخیصی ، رفتارهای جبرانی افراد مبتلا به پر اشتہایی روانی به طور متوسط چند بار در هفته و به مدت چند ماه باید اتفاق افتد تا قابل تشخیص گذاری شود؟

۱. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۲. حداقل ۱ بار در هفته و به مدت ۶ ماه
۳. حداقل ۲ بار در هفته و به مدت ۳ ماه

۲۶- تحریک کدام بخش مغز منجر به ایجاد احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوفیز پسین
۲. هیپوفیز پیشین
۳. هیپوتالاموس جانبی
۴. هیپوتالاموس شکمی

س.م.س.م.۱۰.۱۱.دک.

زمان آزمون (دقیقه): تست، ۶۰: تesh test:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰: تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۲۱۷۷۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

-۲۷- شب ادراری و راه رفتن در حین خواب در کدامیک از مراحل خواب اتفاق می افتد؟

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱. مرحله اول و دوم خواب non-REM | ۳. مرحله دوم و سوم خواب non-REM |
| ۲. مرحله سوم و چهارم خواب REM | |

-۲۸- اختلال پرخوابی اولیه براساس DSM باید چه مدت تداوم داشته باشد تا تشخیص گذاشته شود؟

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ۱. یک ماه | ۲. سه ماه | ۳. شش ماه |
| ۴. یک سال | | |

-۲۹- منظور از کاتاپلکسی چیست؟

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ۱. توهمندی پس از خواب | ۳. حملات غیر قابل مقاومت خواب |
| ۲. از بین رفتن ناگهانی قوام عضلانی | |

-۳۰- فردی از نگاه کردن به افراد برهنه در حال تعویض لباس بدون آنکه آنها باخبر باشند، لذت می برد وی به کدام اختلال مبتلاست؟

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ۱. نمایشگری جنسی | ۳. یادگار خواهی جنسی |
| ۲. تماشاگری جنسی | |
| ۴. یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی | |

-۳۱- کدامیک از اختلال های زیر جزو پارافیلیاها محسوب نمی شود؟

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ۱. تمایل جنسی به کودکان | ۳. واژیسیسم |
| ۲. مازو خیسم جنسی | |
| ۴. سادیسم جنسی | |

-۳۲- دارو شناخته شده برای اختلال نعوظی کدام است؟

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------|
| ۱. بنزودیازپین ها | ۲. ایمی پرامین | ۳. زولپیدام |
| ۴. سیلدنافیل | | |

-۳۳- مهمترین نظریه پذیرفته شده در مورد اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

- | | | |
|-------------|-------------|---------------|
| ۱. روانکاوی | ۲. شرطی شدن | ۳. زیست شناسی |
| ۴. شناختی | | |

-۳۴- درمان اختلال هویت جنسی باید چه مدت قبل از جراحی شروع شود؟

- | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|
| ۱. ۲۴ ماه | ۲. ۱۲ ماه | ۳. ۱ ماه | ۴. ۳ ماه |
| ۴. سیلدنافیل | | | |

-۳۵- در بیماران آلزایمری کدام حافظه ابتدا آسیب می بیند؟

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| ۱. حافظه دور | ۲. حافظه معنایی | ۳. حافظه اخیر |
| ۴. حافظه بلند مدت | | |

س.م.س.م.۱۰.۱۱.دك.

زمان آزمون (دقیقه): تست، ۶۰: تشتیع، ۰:

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانش

۱۲۱۷۲۴۰ - روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۳۶- آسیب دیدن توانایی ها برای انجام اعمال (هدفمند) علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه نامیده می شود؟

۱. آمنزی

۲. اختلال در کارکردهای اجرایی

۳. آگنوزی

- ۳۷- فردی مبتلا به دمانس برای کارهای معمولی خود نیازمند کمک است و ممکن است رفتارهای مشکل داری نظیر پرخاشگری داشته باشد، وی در کدام سطح دمانس جای می گیرد؟

۱. دمانس شدید

۲. دمانس متوسط

۳. دمانس خفیف

۴. سروتونین

۱. نورآدرنالین

۲. استیل کولین

۳. دوپامین

۴- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با آلزایمر چیست؟

- ۳۸- فقر و کندی حرکات ارادی، لرزش مداوم، قامت خمیده، خشکی و کندی در سرعت راه رفتن، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۱. آلزایمر

۲. صرع

۳. پارکینسون

MS .۴

- ۳۹- شایع ترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی کدام است؟

۱. اختلال افسردگی

۲. اختلال اضطراب

۳. اختلال شخصیت

۴. اختلال اسکیزوفرنی